



**Grupo 3 PDSP : Poliadicctos con dependencia de sustancias psicoactivas**

**Número de sujetos** 17 sujetos varones

**Rango de edades** 18 a 38 años

**Diagnóstico** El diagnóstico ha sido establecido de acuerdo a los dos criterios usados en el DSM IV. Presentan disminución de funciones cognitivas posteriores a uso de neurotóxicos (poliadicción a marihuana, cocaína, alcohol)

Han comenzado el consumo de alcohol y/o marihuana en la adolescencia (14 a 18 años). Diez de ellos ha consumido cocaína en los últimos 6 meses previos al entrenamiento, habiendo aumentado progresivamente los niveles de consumo, previo a ser internados. Sólo dos no han accedido a terapia de desintoxicación.

**Actividad académica o laboral** En este grupo 10 sujetos han interrumpido su etapa de escolaridad y otros 7 han abandonado la universidad o su trabajo.

**Rendimiento** Todo el grupo presenta alteraciones en el desarrollo neuropsicológico antes y/o en paralelo al consumo. Dos de ellos han estado involucrados en problemas delictuales. El resto presenta alteraciones en el comportamiento socio-afectivo y conducta desadaptada a normas.

Las funciones disminuidas corresponden a la atención, en concentración, en la selectividad y en atención dividida. La mayoría presenta deficiencias en el desarrollo de los procesos lingüísticos superiores, como se observa en la habilidad para asociar información, en la deducción e inferencia y en análisis e interpretación. Las habilidades de razonamiento lógico están también disminuidas, tanto como la organización de la conducta orientada metacognitivamente. La capacidad intelectual es normal o levemente bajo el rango normal promedio en la escala de WAIS.

**Fármacos** Todos ellos se encuentran en tratamiento con fármacos antipsicóticos atípicos y/o antidepresivos y anticonvulsivantes.

**Grupo 3 PDSP  
Relación entre rendimiento y periodos de tratamiento**

